



Hyvling av livmodermunnen

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

En hyvling av livmodermunnen eller en konisation görs för att avlägsna cellförändringar eller för att få diagnos.

Ingrepp

Ingreppet görs i lokalbedövning eller under sövning. Man avlägsnar en konformad bit av vävnad runt livmodermunnen med en elektrokoagulerande slinga.

Konvalescens

Att återhämta sig från ingreppet och bedövningen på avdelningen tar några timmar.

För att undvika infektion bör man under den tid blödning förekommer (1–2 veckor) avstå från samlag, simning, bad samt användning av tamponger. En god underlivshygien med ofta förekommande tvätt samt byte av binda rekommenderas. Under sjukledigheten bör man undvika tungt arbete.

Smärtbehandling

I allmänhet räcker de receptfria värkmedicinerna som smärtbehandling hemma.

Paracetamol

Anti-inflammatorisk värkmedicin

Stark värkmedicin

Andra mediciner

Eftergranskning sker på den gynekologiska polikliniken eller svaret om provbiten fås hem på posten.

Sjukledigheten för ingreppsdagen.



Tag kontakt

Vid tecken på inflammation (feber, stark smärta, riklig eller illaluktande flytning) eller om blödningen är riklig eller fortgår över två veckor bör man ta kontakt

Den gynekologiska polikliniken vardagar klockan 14.00–15.00 telefon 06 213 2012,

Den dagkirurgiska enheten vardagar klockan 07.00–15.00 telefon 06 213 1552,

Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

Telefonrådgivning måndagar till torsdagar klockan 15.00–08.00 och fredagar klockan 14.00–08.00 samt dygnet runt under helger och veckoslut, telefon 116 117

Österbottens välfärdsområde • www.osterbottensvalfard.fi • Växel 06 218 1111

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.