



Kohdun kaulankanavan suun höyläys

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Kohdun kaulankanavan suun höyläys eli konisaatio tehdään solumuutosten poistamiseksi tai diagnoosiin pääsemiseksi.

Toimenpide

Toimenpide tehdään nukutuksessa tai paikallispuudutuksessa. Toimenpiteessä kohdun kaulakanavasta poistetaan polttavalla silmukalla kartion muotoinen pala näytteeksi.

Toipuminen

Toimenpiteestä ja puudutuksesta toipumiseen osastolla menee muutama tunti. Sairausloman ajan tulee välttää raskaita töitä. Tulehdusriskin vuoksi vuodon (1–2 viikon) ajan tulee välttää yhdyntää, uintia, ammekylpyä ja tamponien käyttöä. Riittävän usein tapahtuva alapesu ja siteen vaihto ovat suositeltavia.

Kivunhoito

Kotona kivunhoidoksi riittävät yleensä ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet.

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Vahva kipulääke

Muut lääkkeet

Jälkitarkastus: Vastaus näytteistä ilmoitetaan kirjeellä tai tarkastus voidaan sopia naistentautien poliklinikalle.

Sairauslomaa on yksi päivä.



Yhteydenotot

Jos esiintyy tulehdusoireita (kuumetta, kovia kipuja, pahanhajuista vuotoa) tai jos vuoto on runsasta tai jatkuu yli kaksi viikkoa, tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen tai hoitavaan yksikköön:

Päiväkirurginen yksikkö, arkisin kello 07.00–15.00, puhelin 06 213 1552

Naistentautien poliklinikka, arkisin kello 14.00–15.00, puhelin 06 213 2012,

Oma terveyskeskus tai työterveyshuolto

Sairaanhoidon puhelinneuvonta maanantaista torstaihin kello 15.00–08.00, perjantaisin kello 14.00–08.00 sekä vuorokauden ympäri viikonloppuisin ja arkipyhäisin, puhelin 116 117

Pohjanmaan hyvinvointialue • www.pohjanmaanhyvinvointi.fi • Vaihde 06 218 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.