



Kyynelkanavan tukos ja kyynelkanavan sondeeraus

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Lapsella todetaan synnynnäinen kyynelkanavan tukos, kun kyynelkanavan alapäässä oleva limakalvopoimu ei ole avautunut vielä syntymähetkellä.

Kyynelkanavan tukoksen oireina ovat rähmivä ja punoittava silmä. Kyynelpussia painaessa kyynelpisteestä saattaa erittyä myös rähmää. Oireet jatkuvat siihen saakka, kunnes kyynelkanavan tukos avautuu.

Vastasyntyneiden kyynelkanavan tukokset avautuvat useimmiten ensimmäisen elinvuoden aikana itsestään, mutta tarvittaessa tukos voidaan avata kirurgisesti lapsen ollessa noin yhden vuoden ikäinen.

Toimenpide

Kyynelkanavan sondeeraus on toimenpide, joka tehdään kevyessä nukutuksessa. Useimmiten kyynelkanava pysyy auki ensimmäisen sondeerauksen jälkeen, mutta joskus voidaan tarvita toimenpiteen uusimista.

Toimenpiteen jälkeen tulee lapselle tiputtaa silmään silmätippoja neljästi päivässä yhden viikon ajan ehkäisemään tulehduksen syntyä.

Kivunhoito

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Yhteydenotot

Mikäli paranemisessa esiintyy ongelmia, ottakaa yhteyttä:

Silmäyksikkö, arkisin kello 09.00–11.00, puhelin 06 213 1592,

Päiväkirurginen yksikkö, arkisin kello 07.00–15.00, puhelin 06 213 1552,

Oma terveystakeskus tai neuvola

Sairaanhoidon puhelinneuvonta maanantaista torstaihin kello 15.00–08.00, perjantaisin kello 14.00–08.00 sekä vuorokauden ympäri viikonloppuisin ja arkipyhisin, puhelin 116 117



Pohjanmaan hyvinvointialue • www.pohjanmaanhyvinvointi.fi • Vaihde 06 218 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.