



Tilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalen

Om slemvecket i den nedre delen av tårkanalen inte öppnas vid födseln, konstateras en medfödd tilltäppning i tårkanalen. Symptomen är varande och röda ögon. Det kan även komma var när man klämmer på tårsäcken. Symptomen fortsätter tills tilltäppningen öppnas. Oftast öppnas tilltäppningen av sig själv under det första levnadsåret, men vid behov öppnas det kirurgiskt när barnet är cirka 1 år.

Ingrepp

Öppning av tårkanalen är ett ingrepp som görs i lätt narkos. Oftast hålls tårkanalen öppet efter ingreppet, men kan vid behov göras på nytt. Efter åtgärden bör man droppa ögondroppar till barnet fyra gånger om dagen i en veckas tid för att förebygga inflammationer.

Smärtlindring

Paracetamol

Anti-inflammatorisk värkmedicin

Tag kontakt

Vid problem med läkningen bör man ta kontakt enligt följande:

Ögonenheten klockan 09.00–11.00, telefon 06 213 1592

Den dagkirurgiska enheten vardagar klockan 07.00–15.00, telefon 06 213 1552

Den egna hälsocentralen eller rådgivning

Telefonrådgivning måndagar till torsdagar klockan 15.00–08.00 och fredagar klockan 14.00–08.00 samt dygnet runt under helger och veckoslut, telefon 116 117