



Tryckflödescystometri

I undersökningen mäts trycket i urinblåsan och urinflödet. Med hjälp av undersökningen får man en uppfattning om hur urinblåsan fungerar. Undersökningen görs av två utbildade sjuksköterskor.

Före undersökningen:

- 1½ vecka före ska ni lämna ett urinprov vid egen hälsocentral, detta är viktigt!
- Ni får äta och dricka normalt
- Ni ska tömma tarmen dagen före undersökningen. Om tarmen inte fungerar normalt kan Ni vid behov använda Microlax-lavemang, som ni kan köpa från apoteket.
- Försök att inte urinera minst 2 timmar före undersökningen, så att ni kan urinera i flödesmätaren, (Om det känns omöjligt, att vänta på er tur på polikliniken, får ni säga det till någon skötare, men gå inte till wc före det!)
- Om ni använder medicin för att lugna ner urinblåsan, såsom Betmiga, Detrusitol, Spasmolyt, Toviaz, Vesicare, Xatral – skall ni sätta medicinen på paus två veckor före undersökningen.
- Fyll i urineringsdagboken och ta med den till undersökningen.

Undersökningen:

Först får ni urinera i flödesmätaren. Vi använder undersökningskatetrar som sätts i urinblåsan och den andra i ändtarmen, några cm in.

Urinblåsan fylls med vätska via katetern och samtidigt mäts det inre trycket i urinblåsan och i buken. När blåsan känns full får ni urinera i flödesmätaren.

Läkaren kollar svaret och meddelar Er senare om resultatet.

Reservera ungefär 1 – 1½ timme för undersökningen.

Om ni har frågor angående undersökningen, kontakta sjukskötare 06 218 8540 eller 040 489 0842, må-to kl. 8:30-9:00

Om ni måste avboka tider, gör det gärna i god tid. Det är svårt att hitta nya tider.